



ESTAT D'INVASIÓ A LA COSTA BRAVA

Planta subespontània als penya-segats de la Costa Brava, però amb un fort comportament invasor.

DESCRIPCIÓ



RM

Arbre caducifoli, dioic (amb individus masculins i femenins en peus separats), d'uns 25 m d'alçada i amb escorça grisa i llisa. Fulles compostes amb 6-12 parells de folíols amples, ovats o lanceolats de 7 a 12 cm i amb 4 dents a la base. En tocar-les desprenen una forta olor fètida. La gran capacitat rebrotadora del sistema radicular fa que en molts casos apareguin nombrosos individus juvenils producte del rebrot. Els individus productors de llavors (femelles) són portadors de grans quantitats de sàmares (llavors alades) que perduren fins ben entrat l'hivern.

REPRODUCCIÓ

Es reproduïx mitjançant llavors que es dispersen amb facilitat pel vent, i també per la gran capacitat rebrotadora de l'arrel que ocasiona el creixement vegetatiu dels rodals.



JLP



JLP



CCO



AMC



Té pocs requeriments, tant hídrics com de qualitat del sòl, cosa que li permet que es pugui establir en una gran varietat d'ambients diferents. Necessita condicions de bona insolació i per tant no apareix gaire sovint en boscos on l'ambient és més ombrívol. En etapes inicials generalment s'estableix a vorals de carreteres i espais alterats, arribant a colonitzar amb facilitat ambients degradats de ribera.

NI

BUSCA-LA AQUÍ

- Vores de carreteres
- Talussos d'àrees periurbanes
- Espais alterats
- Jardins abandonats
- Riberes degradades
- Boscos i zones arbustives

NO LA CONFONGUIS



CCO

Rhus typhina ("sumac")
port arbustiu amb tiges densament pubescentes i folíols amb moltes dents



CCO

Juglans nigra ("noguer negra")
folíols irregularment dentats, més o menys pubescents al revers i especialment als nervis, escorça rugosa i fruits en forma de drupa globosa (nous) molt evidents