



ESTAT D'INVASIÓ A LA COSTA BRAVA

Espècie cultivada des de l'antiguitat principalment per a fer barreres o tallavents vegetals, però també com a material de construcció o suport per al creixement de plantes de diversa mena (tant en agricultura com en horticultura). Actualment, és una espècie molt estesa i naturalitzada al litoral de la Costa Brava, sovint arran de mar.



FC

DESCRIPCIÓ

Planta perenne, molt robusta, proveïda de rizomes (tiges subterrànies) llenyosos. Tiges buides, erectes, de fins a 4 m d'alçada, simples o curtament ramificades als nusos, suaus i glabres. Fulles de 5 a 6 cm d'amplada i de fins a 60 cm de longitud. Flors petites agrupades en una inflorescència en panícula gran, de 30 a 60 cm, en forma de plomall.

REPRODUCCIÓ



CBC

Floreix de juliol a desembre. Es reproduïx per via asexual mitjançant els seus robustos rizomes, que poden assolir considerables distàncies des de la planta mare. Els fragments del rizoma són dispersats pels corrents d'aigua dipositant-se aigües avall.



PBE

Planta que requereix humitat al terra i, per tant viu principalment en ambients de ribera. Suporta molt bé les altes temperatures a l'estiu i té certa capacitat de resistència a la salinitat moderada (per això és freqüent a les platges i al litoral en general).

- Camps de conreu
- Vores de camins
- Llocs alterats
- Rieres, basses, torrents, canals i fonts
- Aiguamolls
- Platges



NO LA CONFONGUIS



Phragmites australis ("canyet d'albufera", "canyís")
 més petita, tija més prima, fulles més curtes i estretes,
 inflorescència (plomall) més oberta i inclinada cap a un costat