



ESTAT D'INVASIÓ A LA COSTA BRAVA

Molt freqüent ja que tendeix a escapar-se dels jardins on es cultiva. Sol aparèixer sovint naturalitzada i, de forma puntual, mostrant caràcter invasor.

DESCRIPCIÓ

Planta perenne, erecta o decumbent de fins a 1 m d'alçada, amb la base sovint llenyosa. Fulles alternes, sèssils, simples, el·líptiques, lleugerament suculentas i amb els marges dentats. Grans caps florals (capítols) de fins a 80 mm de diàmetre i solitaris o en grups a l'extrem de les branques en peduncles curts. Lígules (pètals de les flors exteriors) llargues, de color blanc brillant a la part superior i de color blau o violeta a la part inferior. Disc (flors interiors del capítol) de color blau fosc o porpra. Fruits de 7 x 3 mm, llisos, ovalats o triangulars.




REPRODUCCIÓ

Floreix de març a novembre. Les papallones són els seus principals pol·linitzadors. Els fruits no tenen cap adaptació per la dispersió a llarga distància, el que fa que les noves plàntules es generin molt a prop dels parentals. Tot i que es reproduïx per via sexual, també pot reproduir-se per esqueixos.



ECOLOGIA

Necessita sòls drenats i ambients càlids o temperats, ja que no suporta les gelades intenses (-5 °C). És força resistent a la sequera.



BUSCA-LA AQUÍ

- Penya-segats
- Platges
- Talussos
- Pinedes alterades

NO LA CONFONGUIS



Calendula officinalis ("boixac")
lígules de color taronja

Bellis spp. ("margarida")
mida més petita (habitualment inferior a 30 cm) i capítols també més petits



Glebionis segetum ("ull de bou")
mida més petita (màxim 80 cm), lígules totes tenyides de groc i fulles més dividides

Glebionis coronaria ("bolic")
mida més petita (màxim 80 cm), lígules tenyides de groc (a vegades només a la base) i fulles més dividides