



## ESTAT D'INVASIÓ A LA COSTA BRAVA

Espècie utilitzada en jardineria com a tanca i amb finalitats ornamentals. Observada escapada de cultiu i naturalitzada a diversos punts de la Costa Brava, en ocasions en fase expansiva. Potencialment invasora en aquesta àrea.

## DESCRIPCIÓ

Planta perenne, llenyosa i rizomatosa, de 5 a 12 m d'alçada. Tija principal amb segments articulats (entrenusos) de 15 a 30 cm, separats per anells (nodes). Entrenusos inflats, agrupats a la part inferior d'algunes canyes. Tiges i branques verdes en plantes joves, i groc daurades en plantes madures, de 9 a 15 cm de diàmetre. Branques en parells desiguals amb un solc. D'1 a 5 fulles per branca, de 12 x 2 cm, lanceolades, glabres (sense pèls) a la part superior i pubescents (amb pèls) a la part inferior del nervi central. Sistema subterrani dens format per rizomes, de 4 a 7,5 m.



CGB



JG

## REPRODUCCIÓ

Es reproduïx vegetativament per una mena de xarxa subterrània de rizomes que creix any rere any. Rarament es produeixen flors i llavors.



JG

DC

# ECOLOGIA

Prefereix zones amb plena incidència solar, però també tolera l'ombra, factor que li permet propagar-se als boscos. Presenta un creixement vigorós i una ràpida propagació en sòls margosos humits i profunds. Tolerà temperatures baixes de fins a -20 °C.

JLP



## BUSCA-LA AQUÍ

- Prop de jardins
- Marges de carreteres
- Marges de rius i rierols
- Matollars urbans
- Zones abandonades
- Llocs alterats
- Boscos esclarissats

## NO LA CONFONGUIS



PBE

*Phragmites australis* ("canyís")  
menor alçada, fulles més estretes i  
inflorescències amb llargs pèls



CBC

*Arundo donax* ("canya")  
fulles enteres, molt grans i amples, de gairebé fins  
a 1 m de llarg, plomall gran i erecte