



ESTAT D'INVASIÓ A LA COSTA BRAVA


Tot i que ha estat observada en poques ocasions, presenta un incipient caràcter invasor en zones de rius i de matollar a la Costa Brava.

DESCRIPCIÓ

Arbust de fins a 2 m d'alçada. Fulles variables, de lanceolades a linears, amb el marge dentat o lobulat, d'un color verd fosc brillant a l'anvers i blanc-platejat al revers, gairebé sèssils amb una ala basal que baixa per la tija. Capítols d'1,5 cm, amb flors tubuloses al centre i d'11 a 13 flors ligulades al marge, d'un groc intens, disposats en inflorescències ramificades.




PBE



CGB

REPRODUCCIÓ

Les plantes es troben molt sovint en flor, ja que la floració abasta des d'abril fins a novembre. Les flors es pol·linitzen per insectes i les llavors es dispersen pel vent. El gran període de floració i el seu ràpid creixement a partir de llavors afavoreix el seu caràcter invasor.



PBE



FC

ECOLOGIA

Viu en zones de clima mediterrani marítim, principalment en ambients molt ruderalitzats i antropitzats tot i que també pot aparèixer en ambients forestals i de ribera.

BUSCA-LA AQUÍ

- Marges de camins i pistes forestals
- Marges de carretera
- Clarianes de boscos
- Alzinars o pinedes obertes
- Marges degradats de rius i rieres seques
- Matollars mediterranis
- I en general, en hàbitats més o menys alterats



NO LA CONFONGUIS



PBE



PBE



PBE

Senecio cineraria ("cinerària", donzell de mar")

flors similars, d'aspecte generalment molt cendrós, amb fulles discolors (verdes a dalt i cendroses per sota) però més dividides i amb els lòbuls més arrodonits